

Blinddarmentzündung / Appendizitis

Die akute Appendizitis (Blinddarmentzündung) ist die häufigste chirurgische Erkrankung. Sie kann beim Kind und Jugendlichen schwere Bauchschmerzen auslösen.

Eine akute Appendizitis beginnt zunächst mit Schmerzen um den Nabelbereich, welche sich im weiteren Verlauf in den rechten Unterbauch verlagern. Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Der Schmerz kann durch Erschütterungen ausgelöst werden (sog. Loslass-Schmerz, Schmerz beim Beklopfen des Bauches). Zudem wird Gehen (Springen) als unangenehm empfunden.

Um eine Appendizitis zu diagnostizieren, werden eine körperliche und eine Laboruntersuchung (Blutbild, CRP, Harnstatus) durchgeführt und ein Ultraschall des Bauches gemacht. Die Kinderchirurgen des UKBB operieren die akute Appendizitis mit so genannter Schlüssellochtechnologie, also mit nur einem einzelnen Hautschnitt im Nabel.

Ähnliche Beschwerden – verschiedene Erkrankungen

Um die Diagnose einer Appendizitis zu stellen gilt es, andere Erkrankungen mit ähnlichen Beschwerden auszuschliessen. Folgende Krankheiten haben teilweise vergleichbare Symptome:

- Darminfektion (häufig zusammen mit Übelkeit und Erbrechen)
- Verstopfung
- Bauchfellentzündung
- Harnwegsinfekte (insbesondere bei Kleinkindern)
- rechtsbasale Lungenentzündung oder Mittelohrentzündung (bei Kleinkindern)
- schmerzhafte Verdrehung der Eierstöcke (Mädchen)